

抗生素对抗细菌,对病毒引起的疾病,如普通感冒,大多数的咳嗽和喉咙痛,以及流感,都是不起作用的。
遵医嘱,合理使用;坚持服完整个疗程;不要漏服,因为抗生素在规律使用时效果最好;
不要把药物省出来留着下次用;不要拆开别人的抗生素;将服药时的副作用告诉医生。

爱我,请别这样错爱我

爱我,请别这样打点滴



近日,记者在两家乡镇卫生院看到,不少静脉注射的小患者随监护人乱动,有的离开医护人员视线,有的甚至举着药水瓶在街上晃悠。

镜头一:举着药水瓶,走出医院大门

12月16日上午,记者看到一位打点滴的小患者,跟着监护人举着药水瓶从咸安区

某镇卫生院大门走出,没有看见医护人员阻止。两人在医院大门口的路边走动了一会儿后,又走进卫生院输液室。

镜头二:举着药水瓶,在街头晃悠

当日上午,记者看到一小孩被其2个监护人抱着离开咸安区另一家镇卫生院,一个抱着小孩,另一个举着药水瓶,一起离开镇

卫生院走到街上晃悠。

输液有风险,最好上医院

记者就此打点滴方式的危害性咨询市中心医院 同济咸宁医院急诊科护士长张翠云,张护士长很肯定地对这几种输液方式给予否定。她说带打点滴的小孩在马路转,一是起码的空气洁净度无法保证,药水容易出现污染;二是离开医护人员视线,一旦出现反应无法及时处置,后果将不堪设想。输液治疗是一件比较复杂且存在风险的事情。张护士长建议,患者有病需要打针,建议到正规的医疗机构进行输液治疗。因为医院有24小时消毒空调机消毒,以防交叉感染的专门场所,专业医技人员在无菌环境下规范操作,不会污染药品,上述两条一般个体诊所难以达到要求。

药物有反应,快速可处置

张护士长提醒,患者在医院输液时有医护人员监护、巡视,一旦发生不良反应,比如药物本身会导致反应;输液速度过快会发生反应;另外药物过敏也分迟发性和迟发性,静脉输液,尤其是抗生素,虽然有时候皮试是阴性,但是药物直接进入血管,抗原抗体反应会慢慢形成,就发生迟发性过敏反应,输液反应的机率会随输液次数增多而增多;还有不少中药制剂,由于提纯不好也容易发生输液反应,医护人员就会在第一时间快速处置,将伤害降到最低。

我省人体器官捐献条例明确禁止器官买卖

本报讯《湖北省人体器官捐献条例》已于12月1日起施行,标志着我省人体器官捐献工作进入了法治化轨道,条例明确禁止器官买卖。

《条例》指出,人体器官捐献是社会公益性事业,应当遵从自愿、无偿的原则,不得以任何形式买卖或者变相买卖,各级红十字会负责人体器官捐献的信息登记接收,捐献的器官经国家人体器官分配与共享系统统一分配,捐献人的相关亲属在需要接收器官移植时可以优先排序,省红十字会将设立器官捐献救助基金,对生活困难的捐受双方家庭提供必要的人道援助。
(金镇源 吴丹)

小孩患感冒 请别乱投医

本报讯(记者傅辉)小孩一旦感冒,家长“如临大敌”,不由分说立即送到附近的个体诊所打点滴,有的一打就是3至5天。

据市中心医院 同济咸宁医院儿科主任赵红玲介绍,现在的年轻父母对小孩感冒存在两个认识误区:一是自认很“专业”,给小孩想当然地服感冒药,其实服用感冒药是有很多讲究的,首先要弄清楚什么感冒,其次要把吃的药搞对,一般父母是难以判断准确的,建议最好到医院请专业儿科医师对症治疗;第二个误区,孩子感冒了,不管需不需要,就到私人诊所要求医生打点滴。有时小儿不一定是感冒引起的,连专业儿科医师也不一定一下子就能确诊,所以小儿生病建议到正规医院的儿科进行确诊治疗。

爱我,请别让我“凑热闹”



“前几天,我带孩子到广场玩了一圈,不想回家就感冒了。”患儿母亲李女士后悔不已。

记者在市内各医院小儿注射室、诊所观察,真有点“人满为患”的感觉,记者看到坐门诊的市中心医院儿科主任医师、副教授俞惠莲忙得不可开交,父母或者爷爷奶奶抱着患儿排着长队等候着看病。

好不容易等有一点空隙,俞医师告诉记者,前来医院看病的小孩,大都是病毒

性感冒。建议不要把小孩带到人的地方去,家里有人感冒,房间要加强空气流通,要采取隔离措施,以防交叉感染。冬季气候干燥,天气温差变化大。早晚温度低,中午温度高,大人要及时为小孩添减衣服,注意保暖,不要受凉。多喂小孩温开水。小孩一旦感冒,要及时就诊,特别是一岁以内的小孩,更是不能拖,有咳嗽、喘等症状的小孩更要加强注意,不及时就诊容易出现肺炎等后果。

爱我,请别让我暴饮暴食

前几天,市中心医院 同济咸宁医院儿科接诊一个患儿,上吐下泻,不能进食。

据患儿父母介绍,他们夫妻两在外打工才回来不到二周,觉得亏欠孩子好多,马上又要出去打工,所以只要孩子提出想吃什么就买什么,

喝冷饮,吃零食,引起上吐下泻。市中心医院 同济咸宁医院儿科主任赵红玲说:“所以你们的过分溺爱之心,导致了孩子胃肠功能紊乱。”

赵红玲介绍,秋冬季,孩子患上胃肠功能紊乱,其实是轮状病毒感染所致,开始像

上呼吸道受凉症状,随后出现呕吐和腹泻,病程7至8天,要预防脱水,保证低糖无糖饮食,纠正电解质紊乱。如果患儿不能进食,或者腹泻量大,次数多,需要到医院及时就诊。

爱我,请别让我“抛头露面”

前几天,一对年轻的父母将宝宝抱到医院请医生看病,原来小儿出现喉头水肿。

赵红玲介绍,天气寒冷,气候干燥,空气中粉尘增加、雾霾影响,父母如果将小孩带到外面,可能通过吸入,导致过敏。出现荨麻疹、过敏性紫癜、哮喘发作等过敏性疾病。如果小孩出现上述过敏性症状,一定要

到医院就诊,口服药品,避免接触过敏原,并敷外用药物。严重者要住院治疗,否则会引起其他脏器的损害。

赵红玲表示,荨麻疹是一种过敏性皮肤病,一般也多见于秋冬季等大风的天。风带来的过敏原极易引起发病,虽然在发病时一般只是皮肤上起包,不过也有

可能在内脏中引起反应,比如腹痛、腹泻等。严重的急性荨麻疹还可以发生在喉头,造成喉头水肿,影响呼吸道的畅通,容易造成呼吸障碍,缺氧综合症等一系列缺氧常见的症状,会严重影响脏器的功能,而导致更严重的并发症。

爱我,请别让我“里三层外三层”

“好好的乖乖儿,还不到半岁,怎么说就没了呢?”患儿父母几近崩溃地哀叹,这是目前发生在我市某医院儿科揪心的一幕。

据市中心医院 同济咸宁医院儿科主任赵红玲介绍,有的年轻父母生怕孩子受冷,即使家里有暖气也要把小孩包的太紧,或者给孩子穿的太多,由于小孩小,体温调节中枢功能还不完善,在过热时不能及时调整。加上不会说,也不会表达,只会烦躁不安、吵闹或拒奶,如果家长还没有引起重视,及时为小孩减衣服,就会导致身体液体大量流失,比如流汗,又没有及时给小孩补充水,会导致休

克、多器官功能衰竭,轻则留下后遗症,比如颅内、消化道、心血管等其他器官损伤,重则甚至死亡。

赵红玲忠告,每一位孩子的家长,对孩子切不要包裹得太紧太厚,保暖过度和缺乏新鲜空气会使孩子发生捂热综合征。这种情况病死率很高,而且即使抢救存活,后遗症也很容易发生。

赵红玲提醒,本病多在冬春寒冷季节发生,多见于4个月以内的小婴儿,由于家长害怕小儿受冻给小儿保暖过度所致。

赵红玲建议,宝宝穿衣要比大人多一件、玩时要比静时少一件、室外要比室内多

一件。宝宝睡觉时不应穿棉袄、棉裤,只穿内衣就可以。婴儿闷热综合症宝宝的被褥要松软,不要太厚。新手爸妈要注意千万不要把被褥盖过宝宝的头部,或在外出时不要在宝宝的头部盖上纱巾或毛巾。新手爸妈要勤观察。爸妈要多观察宝宝的情况,如果发现宝宝出现烦躁不安或身上有汗时,就需要给宝宝松开被褥或减少衣服;如果发现宝宝的小手或小脚发凉,体温在36℃以下,就应该给宝宝增添衣服或提高室温。所以说,新手爸妈不要过分“溺爱”宝宝,宝宝的健康需要你们的细心呵护,你们适度的爱才是给宝宝最好的爱。

支架立路边,车上打点滴



11日晚8点半左右,记者在温泉一个体检所门口,看到路边停放着一辆小车,小车旁人行道立有一个输液支架,支架上方挂着两个小药水瓶,一男子坐在驾驶座内输液。这样输液隐患重重,一旦出现交通事故,后果不堪设想。
(傅辉)

共享经验 同促发展

省新华医院来市一医院参观交流

本报讯(记者夏咸芳 通讯员黄安家)12月17日,湖北省新华医院陈家宁院长等一行4人专程来到咸宁市第一人民医院,在该院产科进行了为期2天的参观交流活动。

活动中,该院产科副主任医师郑璐就该院产科医疗技术、教学、科研等方面向陈家宁等一行4人做了详细介绍。随后,省新华医院一行对该院产科进行了实地考察,并学习了该院产科运行管理模式和新业务技术开展情况。

今年12月,该院产科又被评为省级临床重点专科,全市就这一家医院产科获得这个荣誉。